AVERTISSEMENTS A G R I C O L E S DLP-4-3-76159149

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE ===

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX C.C.P. Montpellier 5238-57

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL DE DON'T HOLDHOM BE SONS LEGINE ATTEL THE THEFT TO 34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL: 50 F Régisseur de recettes de la D.D.A.

estrev eb noitactiotus quel el 1976 a

ABRICOTIERS (Régions I-8-9-12-14-16-19-20)

1º - Sur les arbres fruitier ALLINOM

Les conditions climatiques de la semaine dernière ont accéléré le déroulement de la floraison et augmenté les risques de l'installation de la maladie.

Un nouveau traitement est préconisé au début de la chute des pétales, après la fécondation, entre les stades F et G, en vue d'assurer la protection contre cette naladie.

consécutif aux attaques de pucerons, entre l'épiaison et la récolte.

Lorsque des plantes mellifèr MUICIO ura se trouvent sous les arbres ou au milieu

Très souvent, les premières manifestations passent inaperques Aussi convient-il de traiter assez tôt : un prenier traitement est conseillé dès la chute des pétales à l'aide d'un soufre micronisé mouillable, à la dose de 600 grammes à 800 grammes à l'hectolitre, auquel on ajoutera le fongicide de synthèse destiné à lutter contre le Monilia cité ci-dessus

Nova avons localement de dispenibl

le poids total).

POIRIERS (Régions 1-8-9-12-14-16-19-20)

quelques nuciónes anciens (ou très anciens)

Des chancres ou pustules sur bois peuvent héberger la maladie dans les vergers attaqués ces dernières années

nous efforcerons de satisfaire les denande Les conidies, issues de ces chancres, peuvent être à l'origine de contaminations précoces, dès l'apparition des pointes vertes (stades C3 - D). Un traitement est conseillé à ce stade à l'aide d'un produit cuprique à la dose de 250 g Cu métal par hectolitre, soit 0,kg 500 d'un produit commercial à 50 % de cuivre.

2 - un timbre à 0,80 F (collé sur l'enveloppe), CULTURES LEGUMIERES (Toutes régions) contenue en eup 4 03,0 4 serdait en tratus - 2

lettre de demande de manéros: 11 nois à compléter l'affranchissement selon

Ce ravageur provoque des dégêts importants dans de nombreuses cultures légumières et florales. La lutte n'est au point que pour le melon et le haricot.

On a intérêt à ne traiter que la ligne de semis à l'aide d'un des produits suivants, commercialisés:

Chlorfenvinphos Trichloronate

60 g M.A/hl (natière active à l'hectolitre)

60 g M.A/ha

Imprimerie de la Station d'Avertis :: F. JOURNET Le film plastique ne sera placé qu'après le traitement.

N.B. - On ajoute du THIRAME (I50 g M.A/hl) si on désire combattre les maladies causées par les champignons

P1168

Imprimerie de la Station "Languedoc-Roussillon" - Directeur-gérant : L'ABOUTATION

JOURNEY

APPLICATIONS DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE PROTECTION DES ABEILLES

ERTISSEMENTS

L'arrêté complémentaire du 4 février 1976, publié au Journal Officiel du 20 février précise :

"Sont présumés dangereux pour les abeilles tous les insecticides, à l'exception de ceux qui portent sur leurs emballages la mention "non dangereux pour les abeilles" dont a été assortie leur autorisation de vente.

Les traitements réalisés au moyen de produits présumés dangereux pour les abeilles sont interdits, quel que soit l'appareil applicateur utilisé :

- 1º Sur les arbres fruitiers ainsi que sur toutes cultures visitées par les abeilles pendant la floraison, an transluction of crot
 - 2º sur les arbres forestiers ou d'alignement pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons, Un nouveau traitement est
- consécutif aux attaques de pucerons, entre l'épiaison et la récolte.

Lorsque des plantes mellifères en fleurs se trouvent sous les arbres ou au milieu de cultures destinées à être traitées au moyen de ces produits, elles doivent être fauchées ou arrachées avant le traitement. de traiter anser tôt : un prenier traitement

Cet arrêté abroge les dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 février 1975. Tal. a entre et entre cité ci-dessus.

PHYTOMA

Nous avons localement de disponibles quelques numéros anciens (ou très anciens) de Phytoma.

Nos abonnés qui désireraient compléter leur collection peuvent nous écrire en nous indiquant quels nunéros ils souhaitent recevoir. Compte-tenu de nos possibilités nous nous efforcerons de satisfaire les demandes.

procees, dès l'apparition des pointes vertes (stades 03 - Presents suou et est conseille à ce stade à l'aide d'un produit purrique à la dose de 250 g Ou métal par hectolitre,

1 - une enveloppe du format 25 x 35 cm environ à votre adresse,

Ce ravageur provoque des dégêts importants dans de nombreuses cultures légunières

N.B. - On ajoute du THIRAME (150 g M.A/hl) at an désire combattre les maladies causées

- 2 un timbre à 0,80 F (collé sur l'enveloppe),
- 3 autant de timbres à 0,60 F que de numéros demandés (ces timbres seront joints à la lettre de denande de numéros; ils sont destinés à compléter l'affranchissement selon le poids total).

LE-CHEF DE CIRCONSCRIPTION, STATEMENT L'INGENIEUR,

POINTERS (Régions 1-8-9-12-14-16-19-20)

TISSOT

Tirage du 2 mars 1976

I 400 exemplaires

satique ne sere place

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles

Le Directeur : P. JOURNET

Place Chaptal - Montpellier

par les champlemons.